

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白

記

《検査項目》

- 〔3292〕 KL-6
- 〔4110〕 アミオダロン
- 〔2700〕 ゲンタマイシン
- 〔2859〕 アミカシン
- 〔7614〕 トブラマイシン
- 〔4018〕 テイコブラニン
- 〔2869〕 抗 ds-DNA 抗体 IgG
- 〔2870〕 抗 ss-DNA 抗体 IgG
- 〔4054〕 抗 Jo-1 抗体<CLEIA>
- 〔2786〕 抗セントロメア抗体(ACA)
- 〔2528〕 抗ミトコンドリア M2 抗体
- 〔4447〕 HIV-1RNA 定量
- 〔2506〕 BCA225
- 〔2683〕 可溶性 IL-2 受容体(可溶性インターロイキン-2 レセプター)

《変 更 日》 平成 29 年 3 月 31 日（金）受付分より

《変更内容》 詳細は裏面をご参照ください。



《変更内容》

検査コード	項目名称	変更内容	変更後	変更前
3292	KL-6	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
4110	アミオダロン	報告日数	4～6 日	6～8 日
2700	ゲンタマイシン	有効治療濃度	グラム陰性菌感染症に対する 標準治療 Peak 15～20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 未満	Peak 5.0～10.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 2.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下
2859	アミカシン	有効治療濃度	グラム陰性菌感染症に対する 標準治療 Peak 50～60 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 4 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 未満	Peak 20～25 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下
7614	トブラマイシン	有効治療濃度	グラム陰性菌感染症に対する 標準治療 Peak 15～20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 未満	Peak 5～8 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Trough 2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下
4018	テイコプラニン	有効治療濃度	Trough 15～30 $\mu\text{g}/\text{mL}$	Trough 10～30 $\mu\text{g}/\text{mL}$
2869	抗 ds-DNA 抗体 IgG	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
2870	抗 ss-DNA 抗体 IgG	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
4054	抗 Jo-1 抗体《CLEIA》	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
2786	抗セントロメア抗体	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
2528	抗ミトコンドリア M2 抗体	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
4447	HIV-1RNA 定量	検体量	EDTA-2K 血漿 2.1mL	EDTA-2K 血漿 3.5mL
2506	BCA225	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
2683	可溶性 IL-2 受容体 (可溶性インターロイキン-2 レセプター)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL